

ການລ້ຽງງົວແມ່ຜະລິດລູກ



ລ້ຽງງົວໃຫ້ມີຜົນກຳໄລດີ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຍັງແດ່?

- ການລ້ຽງງົວແມ່ພັນໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນຕໍ່ການກັບຄືນຂຶ້ນເພດ ແລະ ການປະສົມພັນຕິດ ເຮັດໃຫ້ງົວແມ່ພັນສາມາດໃຫ້ລູກໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີປີລະໂຕ.
- ການເບິ່ງແຍງຮັກສາງົວນ້ອຍເກີດໃໝ່ຫາຢ່າງນິມ ໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ, ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຕາຍ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຝູງງົວໃນແຕ່ລະປີ.

ສະນັ້ນ, ຜູ້ລ້ຽງງົວແມ່ຜະລິດລູກ ຄວນຮັບຮູ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1 ການປະສົມພັນ ແລະ ການຖືພາ:

- ງົວແມ່ພັນ ທີ່ຈະປະສົມພັນຕິດ ຫຼື ຖືພາ

- ຕ້ອງແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຂຶ້ນເພດ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ປະສົມພັນ.
- ຖ້າງົວແມ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ຫຼື ປະສົມພັນບໍ່ຕິດ ຈະກັບຄືນຂຶ້ນເພດອີກ ສະເລ່ຍ 21 ວັນ (18 ຫາ 24 ວັນ).
- ຖ້າປະສົມພັນຕິດ ງົວແມ່ຈະໃຊ້ເວລາຖືພາ ສະເລ່ຍ 282 ວັນ (274 - 291 ວັນ).
- ສຳລັບ ການລ້ຽງງົວແມ່ຖືພາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດ ແມ່ນຈະໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 5.

ໄລຍະກ່ອນການຂຶ້ນເພດ (Proestrus)	ໄລຍະຂຶ້ນເພດ (Estrus)	ໄລຍະຫຼັງການຂຶ້ນເພດ (Metestrus)			
6 - 12 ຊົ່ວໂມງ	18 ຊົ່ວໂມງ	10 ຊົ່ວໂມງ			
0	6	12			
ໄລຍະເວລາປະສົມພັນ	ໄວເກີນໄປ	ປະສົມໄດ້	ເວລາທີ່ເໝາະສົມ	ປະສົມໄດ້	ຊ້າເກີນໄປ

2 ການລ້ຽງງົວແມ່ຖືພາ 4 ຫາ 6 ເດືອນ: ເປັນໄລຍະທີ່ລູກນ້ອຍມີການຈະເລີນເຕີບແລ້ວ ແລະ ກຽມຢ່າງນິມ, ຖ້າຫາກງົວນ້ອຍກິນຫຍ້າ ແລະ ອາຫານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ງົວແມ່ກໍຕ້ອງການອາຫານເພື່ອນຳໃຊ້ບຳລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ (ບໍ່ຜະລິດນ້ຳນິມ), ລູກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງກໍຍັງນ້ອຍ ງົວແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງການອາຫານໜ້ອຍກວ່າໄລຍະອື່ນໆ ແລະ ອາດໃຊ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າແຕ່ກໍໄດ້ ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍລົງ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນໃຫ້ງົວແມ່ພັນຈ່ອຍຜອມຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.

3 ການລ້ຽງງົວແມ່ຖືພາ 7 ເດືອນ ຫາ ເກີດລູກ: ເປັນໄລຍະສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພາະເປັນໄລຍະທີ່ລູກອ່ອນຢູ່ໃນທ້ອງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ປະມານ 70 ຫາ 80% ແລະ ເປັນໄລຍະທີ່ງົວແມ່ພັນກຽມຜະລິດນ້ຳນິມລ້ຽງລູກນ້ອຍ.

- ຄວນແຍກງົວແມ່ພັນລ້ຽງຕ່າງຫາກ ແລະ ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ເສີມອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊົດເຊີຍຈຳນວນອາຫານທີ່ງົວແມ່ກິນໄດ້ໜ້ອຍລົງ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ງົວແມ່ມີນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຊົດເຊີຍນ້ຳໜັກທີ່ຈະສູນເສຍໄປຫຼັງຈາກເກີດລູກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົວແມ່ສາວແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
- ຖ້າໃຫ້ອາຫານພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປະສົມຕິດຕໍ່າ, ງົວນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ຢ່າງນິມ ມີນ້ຳໜັກຕໍ່າ ແລະ ມີອັດຕາການຕາຍສູງ.
- ໃຫ້ວິຕາມິນ A, D, E, K ແກງົວແມ່ຖືພາໂດຍວິທີການສັກ ຫຼື ປະສົມອາຫານໃຫ້ກິນ ແລະ ມີກ້ອນແຮ່ທາດຫ້ອຍປະໄວໃນຄອກໃຫ້ງົວແມ່ໄດ້ເລຍກິນຕາມໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ງົວແມ່ພື້ນໂຕຫຼັງເກີດລູກໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

4 ການເບິ່ງແຍງງົວແມ່ແລະ ງົວນ້ອຍ ໄລຍະເກີດລູກ: ກ່ອນເກີດລູກ 1 ອາທິດ ຄວນແຍກງົວແມ່ໃຫ້ຢູ່ຄອກຕ່າງຫາກທີ່ມີຄວາມສະອາດ ຫຼື ລ້ຽງຢູ່ໃນທົ່ງຫຍ້າທີ່ສະອາດ, ບໍ່ປຽກຊຸ່ມ ແລະ ສາມາດເບິ່ງແຍງງ່າຍ, ກະກຽມອາຫານ ແລະ ນ້ຳໃຫ້ງົວແມ່ໄດ້ກິນຢ່າງພຽງພໍ. ຖ້າກາຍກຳນົດເກີດລູກຮອດ 10 ວັນ ຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເວລາງົວແມ່ເກີດລູກ ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງ ດັ່ງນີ້:

- ຖ້າງົວນ້ອຍເກີດອອກມາໃນທ່າປີກະຕິ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຊ່ວຍຫຍັງ, ຄວນຍືນຢູ່ຫ່າງໄກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົບກວນ, ເຊິ່ງຈະເກີດອອກມາພາຍຫຼັງເຫັນພິກນ້ຳແຕກ 1 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງ.
- ຖ້າງົວນ້ອຍອອກມາໃນທ່າຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກພິກນ້ຳແຕກ ຄວນໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພາຍໃນ 4 ຊົ່ວໂມງ ງົວນ້ອຍຈະຕາຍ.
- ງົວນ້ອຍເກີດອອກມາໃໝ່ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີໂດຍການເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ, ເອົານ້ຳເມືອກອອກຈາກປາກ, ດັງ, ມັດສາຍປີຫ່າງຈາກຜື່ນທ້ອງ 4 ຫາ 6 ຊັງຕີແມັດ, ຕັດສາຍປີ ແລະ ທາດ້ວຍຢາທົງເຈີໄອໂອດິນ (ຢາເຫຼືອງ).
- ໃຫ້ງົວນ້ອຍໄດ້ກິນນ້ຳນິມເຫຼືອງຈາກແມ່ ພາຍໃນ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກເກີດ ເພາະນ້ຳນິມເຫຼືອງຈະມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານສູງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນມີພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດຕ່າງໆສາມາດຖ່າຍທອດຈາກແມ່ໃຫ້ລູກໄດ້. ຖ້າຫາກງົວນ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນນ້ຳນິມເຫຼືອງ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ງົວນ້ອຍອ່ອນແອ, ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສຸດທ້າຍແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ລ້ຽງຈະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດີປານໃດກໍຕາມ ງົວນ້ອຍກໍຈະຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

5 ການລ້ຽງງົວແມ່ຫຼັງເກີດລູກ ຈົນເຖິງໄລຍະຖືພາໃໝ່ 3 ເດືອນ: ເປັນໄລຍະທີ່ງົວແມ່ພັນມີຄວາມ

ຕ້ອງການອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຊ້ຜື່ນຝຸລະບົບອະໄວຍະວະສືບພັນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳນິມລ້ຽງລູກນ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ການລ້ຽງງົວແມ່ພັນໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນການຈັດການເບິ່ງແຍງເຮັດໃຫ້ງົວແມ່ພັນມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງດີ ແລະ ມີນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ງົວແມ່ກັບຄືນມາຂຶ້ນເພດໄວ, ການປະສົມພັນຕິດກໍຈະດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຫຼຸດໄລຍະຫ່າງຂອງການໃຫ້ລູກລົງໄດ້. ການຈັດການເບິ່ງແຍງງົວແມ່ ແລະ ງົວນ້ອຍ ໃນແຕ່ລະມື້ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ງົວແມ່ ແລະ ງົວນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຄວນແຍກລ້ຽງໃນຄອກຕ່າງຫາກ ທີ່ແຫ້ງ, ສະອາດ ແລະ ອົບອຸ່ນດີ.
- ໃຫ້ງົວແມ່ໄດ້ກິນຫຍ້າອ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ ປະມານ 10 ຫາ 15 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກໂຕ.
- ໃຫ້ອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນ ຫຼື ອາຫານປະສົມ ທີ່ມີທາດຊື່ນລວມ 15 ຫາ 16 ເປີເຊັນ ເປັນອາຫານເສີມ 1 ຫາ 2 ກິໂລຕໍ່ມື້ ຫຼື ອີງຕາມສະພາບຂອງງົວແມ່.
- ສັກຢາວິຕາມິນ A, D, E, K ໃຫ້ງົວແມ່ຫຼັງຈາກເກີດລູກ.
- ມີກ້ອນແຮ່ທາດຫ້ອຍປະໄວໃນຄອກໃຫ້ງົວແມ່ໄດ້ເລຍກິນຕາມໃຈ.
- ສຳລັບ ງົວນ້ອຍອາຍຸ 1 ເດືອນເຄິ່ງ ຄວນຝຶກໃຫ້ກິນອາຫານໝູ່ນ້ອຍດູດນິມມື້ລະໜ້ອຍ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກະເພາະໜັກຂອງງົວນ້ອຍມີການຜັດທະນາໄວຂຶ້ນ ແລະ ງົວນ້ອຍຈະໃຫຍ່ໄວ, ເຊິ່ງຈະສາມາດຢ່າງນິມໄດ້ ເມື່ອອາຍຸ 5 ເດືອນ. ແຕ່ຖ້າງົວນ້ອຍຍັງບໍ່ແຂງແຮງກໍຕ້ອງໄດ້ແກ່ຍາວເວລາອອກໄປ 6 ຫາ 8 ເດືອນ.

